

ISTRUZIONI PAZIENTE POST- CHIRURGIA ORALE

- Farmaci:** attenersi scrupolosamente alle prescrizioni:
Terapia antibiotica: 1 compressa da 1 grammo ogni 12 ore per 6 giorni dopo colazione e dopo cena in associazione a gastroprotettore.
Terapia anti-dolorifica: all'occorrenza secondo secondo dosaggi consentiti.
ATTENZIONE: non assumere farmaci contenenti acido salicilico o salicilati in generale (Aspirina etc). Prolungano i tempi di coagulazione
- Ghiaccio:** Applicare esternamente un impacco freddo o ghiaccio sintetico in corrispondenza della parte operata solo nelle ore successive all'intervento con applicazioni di 15 minuti ad intervalli di 30 minuti, per un totale di 4 applicazioni.
ATTENZIONE: l'uso eccessivo può essere dannoso!
- Sciacqui:** Non eseguirne per le prime 12 ore. Successivamente usare una soluzione di acqua e acqua ossigenata a 12 volumi in parti eguali, oppure clorexidina allo 0,12%, o ancora un antisettico orale del commercio.
- Sanguinamento:** In caso che il sanguinamento continui, sciacquare con una soluzione di acqua e acqua ossigenata ed applicare una garza compressiva. Se persiste il sanguinamento, procurarsi 1 fiala di UGUROL, ed usarla come di seguito: mezza fiala da deglutire e mezza fiala sulla garza applicata nella zona interessata.
- Alimentazione:** cibi liquidi o semiliquidi tiepidi per le prime 12 ore.
- Igiene orale:** sospendere le manovre di spazzolamento nella zona dell' intervento per 24 ore. Successivamente spazzolare con delicatezza.
- Modificazioni esterne:** un gonfiore di entità variabile, a seconda della complessità dell' intervento, fa parte dei normali processi di guarigione. Generalmente il fenomeno va attenuandosi fino a scomparire in 4/6 giorni.

Per ogni altro dubbio, consultare telefonicamente questo studio.

CONSIGLI PARTICOLARI